

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETTIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION de la STATION de BORDEAUX (Tél. 92-26-94)

ABONNEMENT ANNUEL
15 NF

(GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE, LANDES,
BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Chemin d'Artigues, CENON (Gironde)
C. C. P. : BORDEAUX 6707-65

Supplément N° I au Bulletin Technique N° 46 de Juillet 1964

1964-19

AVERTISSEMENTS

VIGNE

Black-Rot : Dans les vignes où les taches sont nombreuses de nouvelles contaminations pourront se manifester sur les raisins malgré la chaleur. Les grappes sèches de l'an dernier restant sur les sarments portent encore des Périthèces non vidés qui peuvent aggraver ces attaques.

En conséquence dans les vignes déjà très atteintes et dans celles qui sont situées à proximité des parcelles incultes, un traitement est conseillé dès à présent.

Un poudrage complémentaire aidera à la protection des grappes.

Dans les vignes actuellement saines ce traitement pourra être reporté au début de la semaine prochaine. Le poudrage ne sera pas nécessaire.

Mildiou : Les fortes chaleurs de ces derniers jours ont diminué les risques de Mildiou. Cependant, la végétation reste très active.

Dans les Charentes où la maladie est plus importante, il serait utile de traiter dès à présent. Pour le reste de la circonscription où les taches sont rares on peut attendre le début de la semaine prochaine.

Vers de la grappe : Des vols, avec prédominance de *Cochylis*, sont signalés en toutes régions. On peut s'attendre comme pour la première génération à des dégâts importants.

Un poudrage de préférence avec une spécialité à base de Parathion, de Malathion ou de Diazinon devrait être appliqué dès à présent.

ARBRES FRUITIERS

Carpocapse des Pommes et des Poires : Le vol des papillons se poursuit et les conditions climatiques sont favorables à la ponte.

Il convient donc de continuer la lutte par un traitement immédiat.

INFORMATIONS

VIGNE

Oïdium : L'Oïdium est en progrès. Prévoir un poudrage au Soufre après le traitement contre le Mildiou ou le Black-Rot.

Araignées jaunes : Cet acarien risque d'apparaître prochainement. Pour éviter les dégâts (marqués par la décoloration du feuillage) en particulier sur sémillon, on pourra à l'apparition des premiers dégâts dans les vignes habituellement envahies, prévoir un traitement avec un acaricide de contact.

Une pulvérisation abondante et soigneuse sera nécessaire pour détruire les oeufs, les larves et les adultes se trouvant sous les feuilles.

Le Contrôleur

chargé des Avertissements

- C. ROUSSEL

Imprimerie de la Station de Bordeaux

Directeur-Gérant : L. BOUYX

Bordeaux, le 7 juillet 1964

L'Inspecteur

de la Protection des Végétaux

J. BRUNETEAU

P 142